

## ¿Qué es ERLEADA™?

ERLEADA™ es un medicamento de venta bajo receta para tratar el cáncer de próstata que no se ha esparcido a otras partes del cuerpo y que ya no responde a un tratamiento médico o quirúrgico que disminuye la testosterona. Se desconoce si ERLEADA™ es seguro y eficaz en los niños.



UNA VEZ  
AL DÍA



POR VÍA  
ORAL



CON O  
SIN ALIMENTOS

## ¿Cómo debo tomar ERLEADA™?

La dosis recomendada de ERLEADA™ es 240 mg (cuatro comprimidos de 60 mg) tomados oralmente una vez al día.

- ✓ Tome ERLEADA™ exactamente según lo indicado por su proveedor de servicios de salud.
- ✓ Tome su dosis recetada de ERLEADA™ 1 vez al día, a la misma hora todos los días.
- ✓ Tome ERLEADA™ con o sin alimentos.
- ✓ Trague los comprimidos de ERLEADA™ enteros.
- ✓ Su proveedor de servicios de salud podrá cambiar su dosis si es necesario.
- ✓ No deje de tomar su dosis de ERLEADA™ recetada sin antes hablar con su proveedor de servicios de salud.
- ✓ Si omite una dosis de ERLEADA™, tome la dosis normal lo antes posible el mismo día. Regrese a su cronograma normal al día siguiente. No tome comprimidos extra para compensar la dosis omitida.
- ✓ Debe comenzar o continuar una terapia análoga de la hormona liberadora de gonadotropina (gonadotropin-releasing hormone, GnRH) durante su tratamiento con ERLEADA™ a menos que se haya sometido a una cirugía para disminuir la cantidad de testosterona en el cuerpo (castración quirúrgica).
- ✓ Si toma demasiado ERLEADA™, llame a su proveedor de servicios de salud o acuda de inmediato a la sala de emergencias del hospital más cercano.
- ✓ Es posible que su proveedor de servicios de salud le haga análisis de sangre para verificar si hay efectos secundarios.

Janssen  
CarePath

### APOYO PARA EL PACIENTE Y EL CUIDADOR

Una vez que su médico haya determinado que ERLEADA™ es correcto para usted, Janssen CarePath puede ayudarlo a encontrar recursos que es posible que usted necesite para ayudarse a comenzar.



#### Comenzar:

Janssen CarePath puede revisar los beneficios de su plan de salud y cobertura del seguro para ERLEADA™, y ofrecer recursos de educación sobre el tratamiento.



#### Pago de ERLEADA™:

Podemos identificar opciones de apoyo por costos que pueden ayudarlo a manejar sus gastos de desembolso personal.



#### Mantenerse en orden:

Comprendemos lo importante que es para usted tomar su medicamento como su médico se lo ha indicado. Janssen CarePath proporciona apoyo para ayudarlo a mantenerse en orden con su tratamiento con ERLEADA™.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

### No tome ERLEADA™ (apalutamida) si usted:

- está embarazada o puede quedar embarazada. ERLEADA™ puede dañar a su bebé en gestación.
- es mujer. ERLEADA™ no se usa en mujeres.

### Antes de tomar ERLEADA™, informe a su proveedor de servicios de salud sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- tiene antecedentes de convulsiones, lesión cerebral, accidente cerebrovascular o tumores cerebrales.
- tiene una pareja que está embarazada o puede quedar embarazada. Los hombres que son sexualmente activos y tienen relaciones con una mujer embarazada deben usar un condón durante el tratamiento con ERLEADA™ y hasta 3 meses después. Si su pareja sexual puede quedar embarazada, se debe usar un método anticonceptivo eficaz (anticoncepción) durante el tratamiento y hasta 3 meses después. Hable con su proveedor de servicios de salud si tiene alguna pregunta sobre la anticoncepción.

## Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su afección o tratamiento, no dude en:



**HABLAR** con su médico y equipo de servicios de salud para asegurarse de recibir instrucciones claras e información de ahora en adelante.



**LLAMAR** al coordinador de atención de Janssen CarePath al 1-833-ERLEADA (1-833-375-3232) para obtener recursos para ayudarlo a comenzar y mantenerse en orden. De lunes a viernes, de 8:00 A. M. a 8:00 P. M. Hora del Este.



**VISITARNOS** en [www.erleada.com](http://www.erleada.com) para obtener más información.

**Informe a su proveedor de servicios de salud acerca de todos los medicamentos que toma**, tanto los que se venden con receta como los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. ERLEADA™ puede interactuar con muchos otros medicamentos. No debe comenzar a tomar ni dejar de tomar ningún medicamento antes de hablar con el proveedor de servicios de salud que le recetó ERLEADA™. Conozca qué medicamentos toma. Lleve una lista de estos con usted para mostrársela a su proveedor de servicios de salud y farmacéutico cuando obtenga un medicamento nuevo.

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ERLEADA™?

#### ERLEADA™ podría causar efectos secundarios graves que incluyen:

- **Caídas y fracturas.** El tratamiento con ERLEADA™ puede causar que los huesos y los músculos se debiliten y puede aumentar el riesgo de caídas y fracturas. Han ocurrido caídas y fracturas durante el tratamiento con ERLEADA™. Las caídas no fueron causadas por pérdida de la conciencia (desmayos) ni convulsiones. Su proveedor de servicios de salud controlará sus riesgos de caídas y fracturas durante el tratamiento con ERLEADA™.
- **Convulsiones.** Si toma ERLEADA™, usted puede tener riesgo de sufrir una convulsión. Debe evitar actividades en las cuales una pérdida repentina de la conciencia pueda causar un daño grave a usted o a otros. Informe a su proveedor de servicios de salud de inmediato si pierde la conciencia o sufre una convulsión. Su proveedor interrumpirá ERLEADA™ si sufre una convulsión durante el tratamiento.

#### Los efectos secundarios más frecuentes de ERLEADA™ incluyen:

- sentirse muy cansado
- hipertensión
- erupción cutánea
- diarrea
- náuseas
- disminución del apetito
- pérdida de peso
- dolor articular
- caídas
- sofocos
- lesión ósea (fractura)
- manos, tobillos o pies hinchados

ERLEADA™ puede causar problemas de fertilidad en hombres, que podría afectar la capacidad de engendrar niños. Hable con su proveedor de servicios de salud si usted tiene inquietudes sobre la fertilidad. **No** done esperma durante el tratamiento con ERLEADA™ y hasta 3 meses después de la última dosis de ERLEADA™.

Informe a su proveedor de servicios de salud si experimenta algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles del ERLEADA™.

Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088.

### ¿Cómo debo almacenar ERLEADA™?

- Almacene ERLEADA™ a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (20 °C a 25 °C).
- Almacene ERLEADA™ en el envase original.
- El frasco de ERLEADA™ contiene un paquete desecante para ayudar a mantener seco el medicamento (lo protege contra la humedad). No tire (descarte) el desecante.
- Proteja ERLEADA™ de la luz y la humedad.

### Mantenga ERLEADA™ y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

### Información general acerca del uso seguro y eficaz de ERLEADA™.

A veces, se recetan medicamentos para otros fines que no son los detallados en un folleto de información para pacientes. No use ERLEADA™ para una afección para la cual no fue recetado. No administre ERLEADA™ a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted. Puede hacerles daño. Si desea obtener más información, hable con su proveedor de atención médica. Puede dirigirse a su proveedor de servicios de salud o al farmacéutico para solicitar información sobre ERLEADA™ que esté escrita para profesionales de la salud.

### ¿Cuáles son los ingredientes de ERLEADA™? Ingrediente activo:



#### Ingredientes inactivos:

silicio coloidal anhidro, croscarmelosa sódica, succinato acetato de hidroxipropil metilcelulosa, estearato de magnesio, celulosa microcristalina y celulosa microcristalina silicificada. El revestimiento contiene óxido de hierro negro, óxido de hierro amarillo, polietilenglicol, alcohol polivinílico, talco y dióxido de titanio.

Fabricado por: Janssen Ortho LLC, Gurabo, PR 00778  
Fabricado para: Janssen Products, LP, Horsham, PA 19044  
© 2018 Janssen Pharmaceutical Companies  
Para más información, visite [www.erleada.com](http://www.erleada.com).



Haga [clic aquí](#) para ver la información importante del producto y analícela con su médico.

6/18 cp-49459v2